

3. VIGILANCIA ATMOSFÉRICA

3.1. Contaminación Atmosférica de Fondo en Áreas Rurales

El “Programa concertado de seguimiento y de evaluación del transporte a gran distancia de los contaminantes atmosféricos en Europa” (Programa EMEP), puesto en marcha en 1977, forma parte del Convenio de Ginebra sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia y tiene cuatro componentes: recogida de datos de emisiones, mediciones de la calidad del aire, modelización del transporte y la dispersión de contaminantes atmosféricos y modelización de la evaluación integrada. La Vigilancia Mundial de la Atmósfera (VAG), es un proyecto del Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA), de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de las Naciones Unidas creado tras la firma del Convenio Meteorológico Mundial. El programa CAMP (“Programa Integral de Control Atmosférico”, fruto del Convenio Oslo-París para la Protección del Medio Ambiente Marino del Nordeste del Atlántico, de 1992) tiene por objeto conocer los aportes atmosféricos a la región del Nordeste Atlántico y estudiar sus efectos sobre el medio marino.

La Red Española EMEP/VAG/CAMP, creada en 1983 y reunificada en 2006, pretende satisfacer los compromisos de medición de contaminantes contraídos por España con los tres Programas anteriores. Las mediciones obtenidas de las estaciones de dicha Red permiten determinar los niveles de contaminación de fondo en una región, así como evaluar el transporte desde fuentes emisoras situadas a grandes distancias de ellas. Por ello, su emplazamiento debe seguir los criterios de representatividad definidos para cada red, que establecen la anchura de su malla y las distancias mínimas a distintos tipos de focos emisores de contaminación. Una estación ha de ser representativa, en cuanto a calidad del aire y precipitación, de un área extensa en torno a ella y, por esta razón, también han de evitarse perturbaciones locales que puedan tener influencia sobre las mediciones.

Las estaciones que formaban en **marzo** de 2008 la red EMEP/VAG/CAMP española eran las siguientes:

ES1 - SAN PABLO DE LOS MONTES (Toledo)

ES5 - NOIA (A Coruña)

ES6 - MAHÓN (Menorca)

ES7 - VÍZNAR (Granada)

ES8 - NIEMBRO-LLANES (Asturias)

ES9 - CAMPISÁBALOS (Guadalajara)

ES10 - CABO DE CREUS (Girona)

ES11 - BARCARROTA (Badajoz)

ES12 - ZARRA (Valencia)

ES13 - PEÑAUSENDE (Zamora)

ES14 - ELS TORMS (Lleida)

ES16 - O SAVIÑAO (Lugo)

ES17 - DOÑANA (Huelva)

Mapa de situación de las estaciones de la red EMEP/VAG/CAMP



A continuación, se exponen los resultados procedentes de los equipos automáticos utilizados en dicha red durante el mes de **marzo** de 2008.

Dióxido de Azufre - SO₂

Técnica de análisis y muestreo: Fluorescencia ultravioleta en continuo, según el método de referencia indicado en la normativa de la Unión Europea (UE).

La UE ha establecido varios umbrales y valores límite de dióxido de azufre.






Dióxido de Azufre (RD 1073/2002, de 18 de octubre)		
Valores límite (fecha de cumplimiento: año 2005)	Valor límite	Período
Valor límite horario para la protección de la salud humana.	350 µg/m ³	Valor medio en 1 h. No debe superarse en más de 24 ocasiones por año civil.
Valor límite diario para la protección de la salud humana.	125 µg/m ³	Valor medio en 24 h. No debe superarse en más de 3 ocasiones por año civil.
Umbrales	Nivel	Período
Umbral de alerta.	500 µg/m ³	Valor medio en 1 h registrado durante 3 horas consecutivas.





Ninguno de ellos ha sido superado en ninguna de las estaciones en este mes.





Por otra parte, en la siguiente tabla se muestran los valores medios mensuales de SO₂ en cada estación.

Estaciones	Valor medio de SO₂ (µg/m³) 1 h
San Pablo de los Montes	0,45
Noia	0,42
Mahón	0,37
Víznar	0,73
Niembro	1,20
Campisábalos	0,38
Cabo de Creus	0,20
Barcarrota	0,31
Zarra	0,77
Peñausende	0,42
Els Torms	0,85
O Saviñao	0,43
Doñana	0,69

Se presentan los gráficos comparativos de la evolución horaria de SO₂ en las distintas estaciones, para el mes de marzo de 2008.







FUENTE:
 Agencia Española de Meteorología.
 Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marítimo.

Dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno - NO₂ y NO_x

Técnica de análisis y muestreo: Quimiluminiscencia en continuo, según el método de referencia indicado en la normativa de la Unión Europea (UE).

La UE ha establecido varios umbrales y valores límite de dióxido de nitrógeno.

Dióxido de Nitrógeno (RD 1073/2002, de 18 de octubre)		
Valor límite (fecha de cumplimiento: año 2010)	Valor límite + Margen de Tolerancia (2008)	
Valor límite horario para la protección de la salud humana.	VL	MDT
	200 µg/m ³	20 µg/m ³
Umbral de alerta.		400 µg/m ³
Umbral de alerta.	Nivel	Período
Umbral de alerta.	400 µg/m ³	Valor medio en 1 h registrado durante 3 horas consecutivas.






MDT (Margen de Tolerancia): Porcentaje del valor límite o cantidad en que éste puede sobrepasarse con arreglo a las condiciones establecidas.





Ninguno de ellos ha sido superado en ninguna de las estaciones en este mes.





Por otra parte, en la siguiente tabla se muestran los valores medios mensuales NO₂ y NO_x en cada estación.

Estaciones	Valor medio de NO ₂ (µg/m ³) 1 h	Valor medio de NO _x (µg/m ³) 1 h
San Pablo de los Montes	2,85	2,97
Noia	2,00	2,16
Mahón	4,59	5,13
Víznar	6,78	7,54
Niembro	4,20	4,47
Campisábalos	2,75	2,94
Cabo de Creus	3,97	4,25
Barcarrota	2,76	2,90
Zarra	3,41	3,54
Peñausende	2,29	2,40
Els Torms	3,54	3,70
O Saviñao	3,47	3,57
Doñana	5,57	6,08

Se presentan los gráficos comparativos de la evolución horaria de NO₂ y NO_x en las distintas estaciones, para el mes de marzo de 2008.







FUENTE:
 Agencia Española de Meteorología.
 Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marítimo.

Ozono superficial - O₃

Técnica de análisis y muestreo: Absorción de ultravioleta en continuo, según el método de referencia indicado en la normativa de la Unión Europea (UE).

La UE ha establecido varios umbrales y valores objetivo de ozono.

Ozono (RD 1796/2003, de 26 de diciembre)		
Valores objetivo (fecha de cumplimiento: año 2010)	Nivel	Período
Valor objetivo para la protección de la salud humana.	120 µg/m ³	Valor medio en 8 h ¹ . No debe superarse en más de 25 ocasiones por año civil.
Valor objetivo para la protección de la vegetación	AOT40 = 18.000 µg/m ³ ·h	Valor acumulado ² de mayo a julio de promedio en un período de 5 años.
Objetivos a largo plazo (fecha de cumplimiento: año 2020)	Nivel	Período
Objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana.	120 µg/m ³	Valor medio en 8 h ¹
Objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación.	AOT40 = 6.000 µg/m ³ ·h	Valor acumulado ² de mayo a julio .
Umbrales	Nivel	Período
Umbral de información.	180 µg/m ³	Valor medio en 1 h
Umbral de alerta.	240 µg/m ³	Valor medio en 1 h, que debe medirse o preverse durante 3 horas consecutivas.

Ninguno de ellos ha sido superado en ninguna de las 13 estaciones con mediciones en este periodo.






En la siguiente tabla se refleja el valor medio horario de ozono durante este mes.





Estaciones	Valor medio de O₃ (µg/m³) 1 h
San Pablo de los Montes	86
Noia	49
Mahón	92
Víznar	85
Niembro	82
Campisábalos	81
Cabo de Creus	74
Barcarrota	58
Zarra	70
Peñausende	93
Els Torms	83
O Saviñao	78
Doñana	76





Se presentan los gráficos comparativos de la evolución horaria de O₃ en las distintas estaciones, para el mes de marzo de 2008.

¹ Promedios móviles de ocho horas, calculados a partir de datos horarios y actualizados cada hora. Cada promedio octohorario así calculado se asignará al día en que dicho promedio termina, es decir, el primer período de cálculo para un día cualquiera será el período a partir de las 17:00 h. del día anterior hasta la 1:00 h. de dicho día; el último período de cálculo para un día cualquiera será el período a partir de las 16:00 h. hasta las 24:00 h. de dicho día.

² AOT40 [expresado en (µg/m³)·h] será la suma de la diferencia entre las concentraciones horarias superiores a los 80 µg/m³ (=40 partes por mil millones) y 80 µg/m³ a lo largo de un período dado utilizando únicamente los valores horarios medidos entre las 8:00 h. y las 20:00 h., Hora de Europa Central (HEC), cada día.







FUENTE:
Agencia Española de Meteorología.
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marítimo.